

Venerdì, 19 Marzo 2021, 15.46

AA

BIBLIOTECA DIGITALE  
BACHECA ANNUNCI  
FORMAZIONE  
BANCA DATI ALIMENTI  
BANDI E CONCORSI  
CERCA LA FARMACIA  
FORUM  
NOVITÀ IN PRONTUARIO  
DALLE AZIENDE

CERCA

HOME SANITÀ FARMACI DIRITTO OMEOPATIA FITOTERAPIA NUTRIZIONE GALENICA RICERCA IN CODIFA PROGETTARE LA FARMACIA

SANITÀ

Home / Sanità

mar 19 2021

## Vaccini ed eventi avversi. Raccomandazioni Sif: aderire a campagna, fare segnalazioni, uso corretto farmaci

TAGS: SOCIETÀ ITALIANA DI FARMACOLOGIA (SIF), REAZIONI AVVERSE AI VACCINI, SIF, VACCINO ANTI-COVID-19



*Aderire alla campagna di vaccinazione indipendentemente dal vaccino proposto, segnalare eventi avversi e non ricorrere a terapie non raccomandate. Le indicazioni della [Società italiana di farmacologia](#)*

Aderire alla campagna di vaccinazione indipendentemente dal vaccino proposto, evitando di rinunciare all'ultimo momento o senza comunicarlo, segnalare eventi avversi sospetti, non ricorrere a terapie non raccomandate (anticoagulanti o antiaggreganti) in assenza di sintomi di alterazione della coagulazione dopo la vaccinazione e in caso solo con consulto medico. Queste le raccomandazioni della [Società italiana di farmacologia \(Sif\)](#) diffuse dopo che il Prac dell'Emm ha concluso che il **vaccino anti-Covid19**, di AstraZeneca continua a mostrare un profilo beneficio-rischio positivo.

### Le raccomandazioni della Sif

L'efficacia documentata del vaccino nel prevenire ospedalizzazioni e decessi da Covid19 supera l'estremamente piccolo rischio di coagulazione intravascolare disseminata o trombosi cerebrale del seno venoso, ribadisce la [Sif](#) in una nota stampa, pertanto "è necessario aderire alla campagna di vaccinazione, come da indicazioni del Ministero della Salute, indipendentemente dal vaccino proposto ed evitare rinunce alla profilassi al fine di non rallentare la stessa campagna vaccinale".

Ecco le raccomandazioni:

- Aderire alla campagna di vaccinazione, come da indicazioni del Ministero della Salute, indipendentemente dal vaccino proposto ed evitando rinunce alla vaccinazione, tardive o non comunicate, al fine di non rallentare la campagna vaccinale;
- Continuare a segnalare gli eventi avversi sospetti che si osservano, indistintamente per tutti i vaccini per Covid19, così come per gli altri vaccini e tutti i farmaci in generale;
- In assenza di segni/sintomi suggestivi di alterazione della coagulazione dopo la vaccinazione, evitare di ricorrere a terapie non raccomandate (anticoagulanti o antiaggreganti) e, ricordare sempre che qualunque terapia va effettuata dopo consulto medico;
- Partecipare, oltre che alla segnalazione di sospette reazioni avverse, laddove proposto, agli studi di farmacovigilanza attiva tramite survey o web-app, volti a monitorare efficacia e sicurezza dei vaccini per Covid19, solo ed esclusivamente, se approvati da Aifa e dal Comitato etico dell'Istituto Spallanzani, come da normativa.

medkey

ACCEDI A MEDIKEY >

Commenta I NOSTRI ARTICOLI! ENTRA NEL FORUM

### i nostri Blog

Cosmesi  
a cura di Elena Penazzi

NaturaMedica  
a cura di Fabio Firenzoli

Nutrire la Salute  
a cura di Rachele Aspesi

Annunci sponsorizzati

RICHIEDI INFORMAZIONI

IN LIBRERIA

Il galenista e il laboratorio  
Scheda Libro >

CONSULTA IL CATALOGO EDIZIONI EDRA >

VACCINI ED EVENTI AVVERSI. RACCOMANDAZIONI SIF: ADERIRE A CAMPAGNA, FARE SEGNALAZIONI, USO CORRETTO FARMACI

### Segnalati disordini della coagulazione: ecco i casi

La nota della Sif ricorda che sono stati "(ri)valutati attentamente tutti i dati pre-clinici e quelli clinici dei trial regolativi del vaccino; sono inoltre stati analizzati tutti i casi riportati al sistema di segnalazione spontanea Eudravigilance e di altre agenzie regolatorie internazionali in merito a disordini della coagulazione ed eventi tromboembolici, comparsi dopo la vaccinazione". Non è stata riscontrata alcuna criticità in relazione alla qualità dei lotti del vaccino che erano stati precauzionalmente sospesi in diversi Paesi europei. A oggi, circa 7 milioni di persone sono state vaccinate con il vaccino AstraZeneca in Europa e 12 milioni nel Regno Unito, ed in altri Paesi è tuttora in corso la vaccinazione. Il tasso di eventi tromboembolici "è inferiore rispetto a quanto atteso in base all'incidenza nota di tali eventi nella popolazione generale. D'altra parte, va ricordato che lo stesso Covid19 è una patologia infettiva che aumenta sensibilmente il rischio di eventi tromboembolici". E precisa: "Sono stati però riportati alcuni disordini della coagulazione di anomala presentazione, associati a trombocitopenia, con o senza sanguinamento, comparsi in un periodo compreso nelle due settimane successive alla vaccinazione. In particolare, nei Paesi europei e nel Regno Unito sono stati riportati 7 casi di coagulazione intravascolare disseminata (Cid) e 18 casi di trombosi cerebrale del seno venoso per i quali sono in corso ulteriori approfondimenti. Di questi casi, che hanno riguardato principalmente donne con età inferiore ai 55 anni, 9 sono stati fatali. È stato concluso che l'efficacia documentata del vaccino nel prevenire ospedalizzazioni e decessi da Covid19 supera l'estremamente piccolo rischio di Cid o trombosi cerebrale del seno venoso. Tuttavia, nella sezione delle precauzioni della scheda tecnica del vaccino sarà descritta la possibilità di comparsa di questi disturbi della coagulazione con indicazione di richiedere immediatamente assistenza medica nel caso in cui dopo la vaccinazione si manifestino sintomi/segni ad essi attribuibili (come ad esempio affanno, dolore al torace, gonfiore o freddo a un braccio o una gamba, forte mal di testa, visione offuscata, sanguinamento persistente, piccoli lividi multipli, petecchie, etc)".

© RIPRODUZIONE RISERVATA



ANNUNCI

INSERISCI IL TUO ANNUNCIO >

Immagine non disponibile


**33**

19/03/2021 9.59.30  
Addetto alla contabilità  
sistema Arca Soft

Vedi tutto l'annuncio >>

Iscriviti a Farmacista33

avrà in anteprima le notizie del giorno



BIBLIOTECA DIGITALE »



Nicoloso B. R. - Le responsabilità del farmacista nel sistema farmacia  
vai al download >>

SUL BANCO



Sostenere il metabolismo dei bimbi - Metabolite Junior

Scheda prodotto »

I PIÙ LETTI DI SANITÀ

08-03-2021 | Mascherine Ffp2 CE 2163. Ente certificatore respinge accuse: sono a norma

13-03-2021 | Certificazione mascherine, i dubbi di farmacisti e consumatori. Ecco il quadro attuale

09-03-2021 | Scontrino elettronico, nuovo tracciato: gli errori più comuni. Ecco cosa fare per risolverli

11-03-2021 | Covid-19 e sicurezza sul lavoro. Da Dvr al medico, ecco gli obblighi per farmacie e parafarmacie

04-03-2021 | Covid-19, Ecm su test diagnostici: esecuzione, normative e organizzazione. Ecco i contenuti del corso

I PIÙ LETTI DI FARMACISTA33

08-03-2021 | Mascherine Ffp2 CE 2163. Ente certificatore respinge accuse: sono a norma

13-03-2021 | Certificazione mascherine, i dubbi di farmacisti e consumatori. Ecco il quadro attuale

VACCINI ED EVENTI AVVERSI. RACCOMANDEAZIONI SIF: ADERIRE A CAMPAGNA, FARE SEGNALAZIONI, USO CORRETTO FARMACI

Like 0

(0 VOTI / MEDIA 0)

ULTIMI ARTICOLI DELLA SEZIONE

19-03-2021 | Farmacisti vaccinatori: via libera previsto nel dl Sostegni. Oggi in Consiglio dei ministri

19-03-2021 | Ricette false per stupefacenti. Nas: due arresti e farmacista sospeso per 12 mesi

19-03-2021 | Tamponi rapidi in farmacia, in Toscana gratuiti per studenti e loro familiari. Il protocollo: Dpi, luoghi e documenti

10-02-2021 | Vaccino AstraZeneca, conservazione e indicazioni d'uso: aggiornamenti dal Ministero

11-03-2021 | Covid-19 e sicurezza sul lavoro. Da Dvr al medico, ecco gli obblighi per farmacie e parafarmacie

09-03-2021 | Scontrino elettronico, nuovo tracciato: gli errori più comuni. Ecco cosa fare per risolverli

ULTIMI MESSAGGI DI SANITÀ

Covid-19, gestione al domicilio: il punto sui farmaci raccomandati. il ruolo della farmacia

Farmacisti vittime del covid: un altro collega scomparso, è il ventottesimo dall'inizio della pandem

Titolarità farmacia comunale. giurisprudenza: prelazione incondizionata dipendenti è incompatibile c

La gestione del rischio clinico

Covid-19 e contagi su lavoro. responsabilità datoriali e nodo vaccini: come cambia lo scenario